

Fig. 1. *Donacia crassipes*.

- 2. - *dentata*.
- 3. - *versicolore*.
- 4. - *aquatica*.
- 5. - *limbata*.
- 6. - *bicolora*.
- 7. - *sparganii*.
- 8. - *polita*.
- 9. - *obscura*.
- 10. - *thalassina*.
- 11. - *brevicornis*.
- 12. - *impressa*.
- 13. - *appendiculata*.
- 14. - *fennica*.
- 15. - *semicuprea*.
- 16. - *clavipes*.
- 17. - *vulgaris*.
- 18. - *simplex*.
- 19. - *cinerea*.
- 20. - *tomentosa*.
- 21. *Plateumaris sericea*.

Fig. 22. *Plateumaris discolor* Panz.

- 23. - *braccata*.
- 24. - *consimilis*.
- 25. - *rustica*.
- 26. - *affinis*.
- 27. *Zeugophora flavicollis*.
- 28. *Lema Erichsoni*.
- 29. - *septentrionis*.
- 30. *Crioceris merdigera* L.
- 31. - *lilii* Scop.
- 32. *Clytra atraphaxidis*.
- 33. *Cryptocephalus Loreyi*.
- 34. - *tricolor*.
- 35. - *signatus*.
- 36. - *carinthiacus*.
- 37. - *sinuatus*.
- 38. - *coryli*.
- 39. - *cordiger*.
- 40. - *8-punctatus*.
- 41. - *6-punctatus*.
- 42. - *variegatus*.

*Ceutorrhynchus consputus* Germ., im Jahre 1824 aus der Umgegend von Halle beschrieben, wurde, aller Vernunft entgegen, unter dem mindestens 10 Jahre später aufgestellten *C. alboscutellatus* Gyll. citirt; ob er mit dieser Art identisch ist, kümmert mich nicht, sondern nur dies, daß er von Seidlitz ohne Grund mit *querceti* Gyll. vereinigt worden ist. Die beiden genannten Arten haben miteinander sehr wenig Aehnlichkeit. *C. querceti* ist dem *Ceutorrhynchid. terminatus* Hbst. täuschend ähnlich (hat aber eine siebengliederige Fühlergeißel und gezähnte Klauen), das Halssch. ist ziemlich weitläufig punktirt, die Fld. sind schwärzlich, mit rothbrauner Spitze, ihre wenigen breiteren und weißlichen Schuppen sind schlank, strichförmig. *Ceul. consputus* dagegen hat einfache Klauen, ein äußerst dicht punktirtes Halssch. und dunkelrothbraune Fld., auf denen die Zwischenstreifen mit je zwei Reihen grauer, leicht aufgerichteter Härchen besetzt und mit zahlreichen breiten, ovalen, weißlichen Schüppchen marmorirt sind, so daß die Grundfarbe dadurch erheblich beeinträchtigt wird. Ich habe den *consputus* bei Sommerfeld gefangen, auch Stücke von Halle und aus anderen Gegenden Thüringens gesehen, Herr Ludy sammelte sehr große Stücke bei Görz. Wahrscheinlich ist *C. granulicollis* Thoms. mit *consputus* zu vereinigen.

J. Weise.